

Вакцинация должна быть проведена как можно раньше.

Целесообразно проверять статус вакцинации в любом возрасте. Пропущенные прививки необходимо немедленно восполнить согласно рекомендациям для соответствующего возраста.

Рекомендации постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), 2020/21. www.stiko.de



ВАКЦИНАЦИЯ ВОЗРАСТ

	в неделях:		в месяцах								в годах											
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	с 18	с 60				
			U4		U5		U6		U7		U7a/U8		U9		U10		U11/11		J2			
Ротавирусы	G1 ^a		G2	(G3)																		
Столбняк ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N			A1		N	A2		N	A ^e							
Дифтерия ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N			A1		N	A2		N	A ^e							
Судорожный кашель ^b Коклюш	G1	N	G2	N	G3 ^c	N			A1		N	A2		N	A3 ^e		N					
Гемофильная инфекция ^b инфекция <i>Тип b</i>	G1	N	G2	N	G3 ^c	N																
Детский паралич ^b Полиомиелит	G1	N	G2	N	G3 ^c	N		A1							N							
Гепатит В ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N																
Пневмококк ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N			S ^g													
Менингококк С						G1	N															
Корь					G1	N	G2	N										S ^f				
Свинка, краснуха					G1	N	G2	N														
Ветрянка Ветряная оспа					G1	N	G2	N														
ВПЧ Вирус папилломы человека												G1 ^d	G2 ^d	N								
Опоясывающий герпес																	G1 ^h	G2 ^h				
Грипп Инflюэнца																	S (ежегодно)					

Сроки следующей вакцинации



ПОЯСНЕНИЯ

- G** БАЗОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (до 3-х частичных прививок G1 - G3)
- S** СТАНДАРТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
- A** РЕВАКЦИНАЦИЯ
- N** ПОСЛЕДУЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ (Базовая иммунизация всех еще не вакцинированных или Завершение неполной серии вакцинаций)
- U** Скрининговое обследование
- J** Обследование подростков (J1 в возрасте 12–14 лет)

- a** Первая доза вакцины с 6-недельного возраста, в зависимости от используемой вакцины, 2-ая или 3-я доза вакцины с интервалом не менее 4 недель.
- b** Недоношенные дети: дополнительная доза вакцины в возрасте 3 месяцев, т. е. всего 4 дозы вакцины.
- c** Минимальный интервал от предыдущей дозы: 6 месяцев.
- d** Две дозы вакцины с интервалом не менее 5 месяцев, с дополнительной вакцинацией, начиная с возраста от 14 лет или с интервалом между вакцинациями менее 5 месяцев между 1-ой и 2-ой дозами Требуется 3-я доза.
- e** Ревакцинация Td (против столбняка и дифтерии) каждые 10 лет. Следующая обязательная вакцинация Td - однократная вакцинация как Tdap (против столбняка, дифтерии, коклюша) или, при наличии показаний, комбинированная вакцинация Tdap-IPV (против столбняка, дифтерии, коклюша и полиомиелита).

- f** Одноразовая вакцинация вакциной MMR (против кори, свинки, краснухи) для всех лиц, родившихся после 1970 г. ≥ 18 лет с неясным прививочным статусом, без вакцинации или только с одной прививкой в детстве.
 - g** Вакцинация 23-валентной полисахаридной вакциной.
 - h** Двухразовая вакцинация адьювантной вакциной против опоясывающего герпеса (инактивированной вакциной) с интервалом от 2 до 6 месяцев.
- * Вакцинацию можно делать в несколько приемов. MMR (против кори, свинки, краснухи) и V можно назначать в один день или с интервалом в 4 недели.